

Landratsamt Waldshut-Tiengen

Landwirtschaftsamt

Pflanzenbau- und Pflanzenschutzhinweis KW 25-2017

Maiszünsler

Am Montag dem 19.06. ist in den frühen Lagen die kritische Temperatursumme erreicht worden, an der die ersten Falter ihren Flug beginnen. Bisher ist noch kein Falter in eine Falle geflogen. Der Einsatz von Trichogramma erfolgt nachdem die ersten Männchen und Weibchen ihren Flug begonnen haben, bzw. nach der ersten Eiablage.

Getreide

Getreidehähnchen können bei den Temperaturen der letzten Tage im Bestand auftreten. Bitte Bestände kontrollieren. Die Schadensschwelle beträgt 0,5 bis 1,5 Eier und Larven je Halm, bzw. 20 % geschädigter Blattfläche, bis zur Milchreife. Wenn die Schadenschwelle überschritten ist kann die Bekämpfung mit einem Insektizid wie Sparviero, Lambda WG oder Nexide erfolgen. Das Behandeln ist nach dem täglichen Bienenflug ist zu empfehlen, um Nützlinge und Bestäuberinsekten zu schonen.

Blattläuse als Saugschädlinge sind ab 65% besiedelter Ähren bzw. Fahnenblätter bekämpfungswürdig.